

## ผลข้างเคียงและการแก้ไข

**1. คลื่นไส้ อาเจียน** เป็นผลข้างเคียงจากยา พบได้ในระยะแรก ต่อมาอาการมักลดลง หากมีอาการมาก แพทย์จะสั่งยาแก้คลื่นไส้/อาเจียนให้รับประทาน

**2. มึนงง ง่วงซึม** พบได้ในระยะแรกของการใช้ยา ญาติต้องคอยระวังดูแลอย่างใกล้ชิด **โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ต้องระวังพลัดตกหกล้ม** ผ่านไปสักระยะอาการเหล่านี้จะดีขึ้น หากไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์



**4. อาการถอนยา** จากการหยุดยาทันทีหากใช้ยาขนาดสูงเป็นระยะเวลานาน

## อาการที่ควรมาพบแพทย์

1. ทานยาตามแพทย์สั่งแล้วยังมีอาการปวดรุนแรง
2. มีผลข้างเคียงมาก เช่น คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนอย่างมาก ไม่ดีขึ้นหลังทานยาบรรเทาอาการ



3. ง่วงซึม ปลุกไม่ตื่น อาจเกิดจากยาเกินขนาด กัดกรรไกรหายใจ ให้รีบพามาที่ห้องฉุกเฉิน

หากมีคำถามเพิ่มเติมติดต่อสอบถามที่

**คลินิกะงับปวด**

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

เวลาทำการ จันทร์ถึงศุกร์ 09.00-12.00 น.

โทร 045-319200 ต่อ 2327



## คำแนะนำ การใช้ยามอร์ฟิน (Morphine)

### สำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล



### คลินิกะงับปวด

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ปรับปรุง ปี 2566



# ยามอร์ฟิน (Morphine) คืออะไร

ยามอร์ฟิน คือ ยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์ ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีความปวดระดับรุนแรง มักใช้ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด หรือผู้ป่วยโรคมะเร็ง มีผลข้างเคียงหลายชนิด ควรใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น ห้ามปรับยาเอง หยุดยาเองหรือแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้

ยามอร์ฟิน แบ่งตามระยะเวลาการออกฤทธิ์ มี 2 ประเภท

- ออกฤทธิ์นาน ให้รับประทานตามเวลาที่แพทย์สั่ง
- ออกฤทธิ์เร็ว ให้รับประทานเวลาปวด

## มอร์ฟินชนิดเม็ดออกฤทธิ์นาน

### # (Prolonged-Release Morphine Sulfate Tablet)

ไม่บด/ไม่หักเม็ด ยา มี 2 ขนาด คือ 10 มิลลิกรัม (สีเหลือง) และ 30 มิลลิกรัม (สีม่วง)



ขนาด 10 มิลลิกรัม (สีเหลือง)

ขนาด 30 มิลลิกรัม (สีม่วง)



เริ่มออกฤทธิ์ : 1 ชั่วโมง  
ระยะเวลาออกฤทธิ์ : 8-12 ชั่วโมง  
วิธีใช้ : รับประทาน 1 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง

### # (Sustained-Release pellets)

สามารถแกะแคปซูลให้ยาใส่สายอาหารได้



ขนาด 50 มิลลิกรัม

เริ่มออกฤทธิ์ : 2-4 ชั่วโมง  
ระยะเวลาออกฤทธิ์ : 12-24 ชั่วโมง  
วิธีใช้ : รับประทาน 1 เม็ด วันละครั้ง

## ออกฤทธิ์เร็ว (immediate release)

เริ่มออกฤทธิ์ : 15-30 นาที  
ระยะเวลาออกฤทธิ์ : 2-4 ชั่วโมง

## #มอร์ฟินออกฤทธิ์เร็วชนิดน้ำ



รับประทาน 1 ช้อนชา หรือ 5 ซีซี ทุก 2 ชั่วโมง เวลาปวด

## #มอร์ฟินออกฤทธิ์เร็วชนิดเม็ด



สามารถ บด/หักเม็ดยาได้  
รับประทาน 1 เม็ด ทุก 2 ชั่วโมง เวลาปวด